

# BORDO 20WP

Bordeaux Mixture (Βορδιγάλειος πολτός)


Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 20% β/β  
(σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)  
Βοηθητικές ουσίες 21,57% β/β

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους  
υδρόβιους οργανισμούς με  
μακροχρόνιες επιπτώσεις

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Πενικιλαμίνη  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).  
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.  
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό το λεπτό).

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά αφού φουσκώσουν τα μάρτα. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγούμενως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Νεραντζιά, Φράπα): **Δόση** 400 γρ. **α) Για Κορυφοξήρα:** Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **β) Για Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών:** Εφαρμογή μετά χαλάζι ή παγετό.
- **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): **Δόση** 400 γρ. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Κορύννεο:** Μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνεται άλλη 1 εφαρμογή εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. **ΚΑΡΥΔΙΑ: Ανθράκνωση:** Συνιστώνται εφαρμογές που αρχίζουν πριν **εκπτυχθούν** τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση.
- **ΜΗΛΙΑ:** **Δόση** 550-625 γρ. **Φουζικλάδιο:** Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά, Βυσσινιά): **Δόση** 425 γρ. **Εξώσκος, Κορύννεο, Φαιά σήψη:** Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτα.
- **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): **Δόση** 550-650 γρ. **Περωνόσπορος, ανθράκνωση:** Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών.
- **ΕΛΙΑ:** **Δόση** 600-650 γρ. **α) Για Κυκλοκόνιο:** 2 εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. **β) Για Γλοιοσπόριο:** 2 εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. **γ) Για Καρκίνωση:** εφαρμογές μετά από χαλάζι ή παγετό.
- **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Κρεμμύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Σέλινο, Πράσο, Πεπόνι, Καρπούζι, Φασόλι): **Δόση** 350 γρ. **α) Για Περωνόσπορο, Σπτορίωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. **β) Για Ανθράκνωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. **γ) Για Βακτηριώσεις:** Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σταματούν στην καρπώδη.
- **ΤΟΜΑΤΑ** (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Δόση** 550-625 γρ. **α) Για Περωνόσπορο:** Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **β) Για Βακτηριακή κηλίδωση:** Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της.
- **ΠΑΤΑΤΑ:** **Δόση** 275-612.5 γρ./στρ. (βαριά προσβολή) ή 175-275 γρ./στρ. (ελαφριά προσβολή). **Περωνόσπορος:** Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
- **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** **Δόση** 550-650 γρ. **Κερκοσπορίωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.
- **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** **Δόση** 550-650 γρ. **α) Για Περωνόσπορο, Σπτορίωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. **β) Για Φυτόφθορα:** Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.

**Παρατηρήσεις:** 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τη μηλιά και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 2) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 3) **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** Εσπεριδοειδή 200-250, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Μηλιά 100-150, Πυρηνόκαρπα 100-120, Αμπέλι, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά 50-100, Ελιά 150, Λαχανικά 50-80, Ζαχαρότευτλα 40.  
**Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**  
**Εσπεριδοειδή, Μηλιά, Πυρηνόκαρπα, Ελιά = 2.** Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Αμπέλι, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά = 3. Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα = 4.  
**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Εσπεριδοειδή, Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες. Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες. Μηλιά, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Αμπέλι: (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες. Λαχανικά (Υ+Θ): 7 ημέρες. Τομάτα Υπαίθρου: 10 ημέρες. Τομάτα Θερμοκηπίου: 7 ημέρες.

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 60.750/13.12.2018**

**Κάτοχος της άδειας:** ALINTRA S.A., Garbí 3, Polígono Industrial Can Volart, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain

Αριθ. Παρτίδας (Batch No): Βλέπε επί  
Ημερ. Παρασκευής (Prod.Date): της συσκευασίας

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

25 κιλά



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -  
Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Όση Εμπορική, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
www.ellagret.gr